

EXERCICE 1

4 points

1. On pose, pour tout entier naturel n non nul,

$$I_n = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-x)^n e^{-x} dx.$$

- a. À l'aide d'une intégration par parties, calculer I_1 .
 b. Prouver que, pour tout entier naturel n non nul,

$$0 \leq I_n \leq \frac{1}{n!} \int_0^1 e^{-x} dx.$$

En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

- c. Montrer, en utilisant une intégration par parties que pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$I_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} - I_n$$

2. On considère la suite réelle (a_n) , définie sur \mathbb{N}^* par $a_1 = 0$ et, pour tout entier naturel n non nul,

$$a_{n+1} = a_n + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

- a. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n non nul,

$$a_n = \frac{1}{e} + (-1)^n I_n.$$

- b. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

EXERCICE 2

4 points

On considère l'application f qui à tout nombre complexe z différent de 1, associe le nombre complexe

$$f(z) = \frac{2-iz}{1-z}.$$

L'exercice étudie quelques propriétés de f .

Le plan est rapporté à un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) d'unité graphique 2 cm, dans lequel seront représentés les ensembles trouvés aux questions 1. et 2..

A est le point d'affixe 1 et B celui d'affixe $-2i$.

1. On pose $z = x + iy$ avec x et y réels.

Écrire $f(z)$ sous forme algébrique. En déduire l'ensemble des points M d'affixe z tels que $f(z)$ soit un réel et représenter cet ensemble.

2. On pose $z' = f(z)$.

- a. Vérifier que i n'a pas d'antécédent par f et exprimer, pour z' différent de i , z en fonction de z' .
 b. M est le point d'affixe z (z différent de 1) et M' celui d'affixe z' (z' différent de i).

Montrer que $OM = \frac{M'C}{M'D}$ où C et D sont les points d'affixes respectives 2 et i .

- c. Montrer que, lorsque le point M décrit le cercle de centre O et de rayon 1 privé du point A , son image M' appartient à une droite fixe que l'on définira géométriquement.
- d. Montrer que, si M est un point de l'axe des réels, différent de O et de A , alors M' appartient à la droite (CD) .

EXERCICE 2 (SPÉCIALITÉ)

4 points

1. On considère l'équation (1) d'inconnue (n, m) élément de \mathbb{Z}^2 :

$$11n - 24m = 1.$$

- a. Justifier, à l'aide de l'énoncé d'un théorème, que cette équation admet au moins une solution.
- b. En utilisant l'algorithme d'Euclide, déterminer une solution particulière de l'équation (1).
- c. Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (1).

2. recherche du P.G.C.D. de $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.

- a. Justifier que 9 divise $10^{11} - 1$ et $10^{24} - 1$.
- b. (n, m) désignant un couple quelconque d'entiers naturels solutions de (1), montrer que l'on peut écrire

$$(10^{11n} - 1) - 10(10^{24m} - 1) = 9.$$

- c. Montrer que $10^{11} - 1$ divise $10^{11n} - 1$.
(on rappelle l'égalité $a^n - 1 = (a - 1)(a^{n-1} + a^{n-2} + \dots + a^0)$, valable pour tout entier naturel n non nul).
Déduire de la question précédente l'existence de deux entiers N et M tels que :

$$(10^{11} - 1)N - (10^{24} - 1)M = 9.$$

- d. Montrer que tout diviseur commun à $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$ divise 9.
- e. Déduire des questions précédentes le P.G.C.D. de $10^{24} - 1$ et $10^{11} - 1$.

PROBLÈME

12 points

Dans tout le problème, (\mathcal{C}) désigne la courbe d'équation $y = \ln x$ représentant la fonction logarithme népérien dans le plan rapporté à un repère orthonormal d'origine O et d'unité graphique 4 cm.

Question préliminaire : Tracer avec soin mais sans étude de la fonction, la courbe (\mathcal{C}) et la droite (D) d'équation $y = x$.

Partie A

1. a. Déterminer une équation de la tangente (Δ) à (\mathcal{C}) au point I d'abscisse 1.
- b. Étudier les variations de la fonction f définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par

$$f(x) = x - 1 - \ln x.$$

- c. En déduire la position de (\mathcal{C}) par rapport à Δ .

2. a. Déduire de la question précédente la valeur minimale prise par $x - \ln x$ sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
- b. M et N sont les points de même abscisse x des courbes (\mathcal{C}) et (D) respectivement.
Déterminer la plus petite valeur (exprimée en cm) prise par la distance MN lorsque x décrit l'intervalle $]0 ; +\infty[$.

Partie B

1. Soit M le point d'abscisse x de la courbe (\mathcal{C}) . Exprimer la distance OM de l'origine à M en fonction de x .
2. Étude de la fonction auxiliaire u définie sur $]0 ; +\infty[$ par $u(x) = x^2 + \ln x$.
- a. Justifier les limites de $u(x)$ en 0 et en $+\infty$ ainsi que le sens de variations de u .
- b. Montrer qu'il existe un réel α et un seul tel que $u(\alpha) = 0$.
Montrer que α est compris entre 0,5 et 1 puis donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-2} .
- c. Déterminer le signe de $u(x)$ suivant la valeur de x .
3. Étude de la fonction g définie sur $]0 ; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + (\ln x)^2$.
Calculer $g'(x)$ et vérifier que $g'(x) = \frac{2}{x}u(x)$.
En déduire le tableau de variations de g .
4. Déduire des questions précédentes la valeur exacte de la plus courte distance de l'origine aux points de la courbe (\mathcal{C}) et en donner une valeur approchée (exprimée en cm) en utilisant pour α la valeur centrale de l'encadrement trouvé à la question 2. b.
5. A étant le point d'abscisse α de (\mathcal{C}) , démontrer que la tangente en A est perpendiculaire à la droite (OA) .

Partie C Étude d'une suite

1. Montrer que le réel α défini dans **la partie B** est solution de l'équation $h(x) = x$, où h est la fonction définie sur $]0 ; +\infty[$ par
2. a. Calculer $h'(x)$ et étudier son signe sur l'intervalle $[\frac{1}{2} ; 1]$.
- b. Prouver que $h([\frac{1}{2} ; 1]) \subset [\frac{1}{2} ; 1]$.
- c. Calculer $h''(x)$ et étudier son signe sur l'intervalle $[\frac{1}{2} ; 1]$.
- d. En déduire que, pour tout x appartenant à l'intervalle $[\frac{1}{2} ; 1]$, on a

$$0 \leq h'(x) \leq 0,3.$$

3. On définit la suite (u_n) par : $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = h(u_n).$$

- a. Montrer que, pour tout entier naturel n , $\frac{1}{2} \leq u_n \leq 1$, et que la suite (u_n) est décroissante.
- b. Attention, cette question n'est plus au nouveau programme du baccalauréat S.
En utilisant l'inégalité des accroissements finis, montrer que l'on a pour tout entier naturel n , $|u_{n+1} - \alpha| \leq 0,3|u_n - \alpha|$ puis que $|u_n - \alpha| \leq \frac{1}{2}(0,3)^n$.
- c. En déduire que la suite (u_n) converge vers α .
- d. Déterminer un entier n_0 tel que u_{n_0} soit une valeur approchée de α à 10^{-5} près et indiquer la valeur de u_{n_0} donnée par la calculatrice (avec 5 décimales).